

My 5 Moments for Hand Hygiene


Focus on caring for a patient with peripheral venous catheter

PULISCI LE TUE MANI IMMEDIATAMENTE PRIMA di ogni manipolazione del CVP e del sistema infusionale di somministrazione farmaci ev, come:

2a posizionamento o rimozione del CVP (prima di indossare i guanti puliti NON sterili) sostituzione della medicazione, prelievo di sangue, o prima di preparare i dispositivi associati alle suddette procedure;

2b manipolazione (apertura) del set di somministrazione e della linea infusionale;

2c preparazione di farmaci da infondere attraverso il CVP.



Key additional considerations for peripheral intravenous catheters

- 1. Indication:** Ensure that a peripheral venous catheter is indicated. Remove the catheter when no longer necessary/clinically indicated.
- 2. Insertion/maintenance/removal**
 - 2.1** Prepare clean skin with an antiseptic (70% alcohol, tincture of iodine, an iodophor, or alcohol-based 2% chlorhexidine gluconate) before catheter insertion.
 - 2.2** Wear clean, non-sterile gloves and apply an aseptic procedure (with non-touch technique) for catheter insertion, removal, and blood sampling.
 - 2.3** Replace any dry gauze-type dressings every 2 days.
 - 2.4** Consider scheduled catheter change every 96 hours.
 - 2.5** Change tubing used to administer blood, blood products, chemotherapy, and fat emulsions within 24 hours of infusion start. Consider changing all other tubing every 96 hours.
- 3. Monitoring:** Record time and date of catheter insertion, removal and dressing change, and condition (visual appearance) of catheter site every day.



World Health Organization

SAVE LIVES
Clean Your Hands

Clean Care
is Safer Care
2005-2015

ULTERIORI CONSIDERAZIONI CHIAVE PER UN PAZIENTE PORTATORE DI CVP

- 1. Indicazioni:** accertati che vi sia un'indicazione appropriata per posizionare un CVP. Rimuovi il CVP quando non è più clinicamente necessario / indicato;
- 2. Inserimento / gestione / rimozione**
 - 2.1.** Pulisci e disinfetta la cute con un antisettico (70% alcol, iodoforo o clorexidina gluconato 2% a base alcolica) prima di inserire il CVP;
 - 2.2.** Indossa guanti puliti NON sterili e applica una procedura asettica (tecnica no-touch) per l'inserimento del CVP, la rimozione del CVP e il prelievo di sangue;
 - 2.3.** Sostituisci la medicazione di garza ogni 2 giorni;
 - 2.4.** Prendi in considerazione di sostituire il CVP ogni 96 ore;
 - 2.5.** Cambia i deflussori utilizzati per somministrare sangue, emoderivati, chemioterapia, e lipidi entro 24 ore dall'inizio dell'infusione; prendi in considerazione di cambiare qualsiasi altro deflussore ogni 96 ore;
- 3. Monitoraggio:** registra data e ora dell'inserimento del CVP, della rimozione, del cambio medicazione e controlla ogni giorno visivamente il sito di inserzione del CVP.